



បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ ថ្នាំកសិកម្មលើដំណាំស្រូវប្រាំង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់



ស្មេងខ្ញុំទីនេះ!


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

☎ 011 96 26 26

📍 Kamhero Agriculture



ដំណាក់កាលលូតលាស់នីមួយៗរបស់ដំណាំស្រូវ



រដូវលូតលាស់
(មានការប្រែប្រួលទៅតាមពូជនីមួយៗ)

រដូវផលិត
(មានរយៈពេល ៣៥ ថ្ងៃ)

រដូវទុំ
(មានរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ)

វគ្គ១: វគ្គលូតលាស់

1. ដំណាក់កាលដុះពន្លក

- ស្រូវអាយុ ១-៣ថ្ងៃ : ប្រើ **ហេស្រូវ១** (១ លីត្រ) លាយក្នុងទឹក ប្រើសម្រាប់ដី ១ ហិកតា ដើម្បីបាញ់យុំគ្រាប់ស្មៅក្នុងស្រែ។



- ស្រូវអាយុ ២-៥ថ្ងៃ : ប្រើ **ហេស្រូវ១** (១ លីត្រ) + **ហេស្រូវ២** (៤០០ ក្រាម) លាយក្នុងទឹក ប្រើសម្រាប់ដី ១ ហិកតា ដើម្បីបាញ់យុំគ្រាប់ស្មៅ និងកក់ក្នុងស្រែ។



2. ដំណាក់កាលសំណាប

- ស្រូវអាយុ ១៥-២៥ថ្ងៃ : ប្រើ **ស្មៅចាស់** (៥០០ ម.ល) + **ហេប៊ី400** (២ ប្រអប់) លាយក្នុងទឹក ប្រើសម្រាប់ដី ១ ហិកតា ដើម្បីបាញ់សម្លាប់កក់ ស្មៅគល់ក្រហម និងស្មៅស្លឹកស្រួចក្នុងស្រែ។



3. ដំណាក់កាលបែកគុម្ព

ប្រើ **ដង្កូវ១០០** (៥០០ ម.ល) + **វគ្គ១** (៥០០ ក្រាម) + **រ៉ូរ៉ាតាមេរ្យ** (២៨០ ក្រាម) + **ដែលតា** (៣០០ ម.ល) លាយក្នុងទឹក ប្រើសម្រាប់ដី ១ ហិកតា ដើម្បីការពារដំណាំពីពពួកដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវកាត់ស្លឹក ជំងឺអុចត្នោត និងធ្វើឱ្យស្រូវលូតលាស់បានល្អ។



4. ដំណាក់កាលពន្លតដើម

ប្រើ **ស្រូវពេជ្រ** (៥០០ ម.ល) + **រត្ន២** (៥០០ ក្រាម) + **រ៉ូប៊ីន** (១២០ ក្រាម) + **ដែលតា** (៣០០ ម.ល) លាយក្នុងទឹក ប្រើសម្រាប់ដី ១ ហិកតា ដើម្បីការពារដំណាំពីដង្កូវស៊ីរងដើមឬចាក់គល់ ដង្កូវមូរស្លឹក ជំងឺ និងបំប៉នស្រូវឱ្យលូតលាស់បានល្អ។



រត្ន២: រត្នផលិត

1. ដំណាក់កាលកើតកូរ

ប្រើ **ស្រូវពេជ្រ** (៥០០ ម.ល) + **រត្ន២** (៥០០ ក្រាម) + **រ៉ូប៊ីន** (១២០ ក្រាម) + **ដែលតា** (៣០០ ម.ល) លាយក្នុងទឹក ប្រើសម្រាប់ដី ១ ហិកតា ដើម្បីការពារដំណាំពីដង្កូវស៊ីរងដើមឬចាក់គល់ ដង្កូវមូរស្លឹក ជំងឺ និងបំប៉នស្រូវឱ្យលូតលាស់បានល្អ។



2. ដំណាក់កាលផើម

ប្រើ **ប៊ីវ៉ែន** (១ លីត្រ) + **ធុតាស៊ី** (៥០០ ម.ល) + **ស្រូវពេជ្រ** (៥០០ ម.ល) + **ដែលតា** (៣០០ ម.ល) លាយក្នុងទឹក ប្រើសម្រាប់ដី ១ ហិកតា ធ្វើឱ្យស្រូវមានដង្ហើមធំ ចេញស្រុះ និងគ្រាប់ពេញល្អ។



3. ដំណាក់កាលចេញកូរ

ប្រើ **រ៉ូប៊ីន** (១២០ ក្រាម) + **ស្រូវមាសខាតិ** (៥០០ ម.ល) + **រត្នប** (៥០០ ក្រាម) លាយក្នុងទឹក ប្រើសម្រាប់ដី ១ ហិកតា ដើម្បីការពារពីពពួកសត្វស្លាបរឹង ជំងឺរលាកកក្ករ ជំងឺអុចត្នោត និងធ្វើឱ្យគ្រាប់ធំស្អាត ។




រត្នព័: រត្នទុំ (ដំណាក់កាលដាក់មេរ្យា)

ប្រើ **រ៉ូយ៉ាល់** (៥០០ ម.ល) + **ខេអូ មមាច** (៥០០ ម.ល) + **រត្នព័** (៥០០ ក្រាម) លាយក្នុងទឹក ប្រើសម្រាប់ដី១ ហិកតា ធ្វើឱ្យគ្រាប់ភ្លឺល្អ និងការពារពីសត្វមមាចស៊ីបំផ្លាញ។



វិធីសាស្ត្រលាយថ្នាំកសិកម្មទៅតាមទម្រង់

- ចាក់ទឹកស្អាតកន្លះធុងបាញ់ថ្នាំសិន មុនពេលដាក់ថ្នាំកសិកម្មចូល
- ត្រូវដាក់ថ្នាំកសិកម្មចូលទៅក្នុងធុង ទៅតាមលំដាប់នៃទម្រង់នីមួយៗ (ឧទាហរណ៍: ទម្រង់ថ្នាំនៅលេខរៀងទី១ ត្រូវដាក់មុនគេ)
- រាល់ពេលដាក់ថ្នាំនីមួយៗ ត្រូវកូរឱ្យបានសព្វល្អជាមុនសិន ទើបដាក់ថ្នាំបន្ទាប់



រដ្ឋជីវិតដង្កូវមូរស្លឹកលើស្រូវ



រដ្ឋជីវិតមមាចត្នោតលើស្រូវ

